



愛滋疫情現況及 校園愛滋防治工作重點報告






愛滋病是人類健康安全最重要的議題
嚴重威脅到國家安全
聯合國安理會第1308號決議案表示：「愛
滋病可能對國家穩定與安全產生威脅」
這是聯合國首次將疾病列為安全議題
其嚴重性為全球安全焦點



愛滋疫情

(73年-101年)

	女性	男性
■ 累計愛滋病毒感染者通報人數	1,707	22,532
■ 累計發病(AIDS)人數	637(37.3%)	9,088(40.3%)
■ 累計死亡人數	307(18.0%)	3,464(15.4%)






本國籍愛滋病毒感染者(HIV) 依危險因素統計 (1984-2012)

危險因素	2008		2009		2010		2011		2012.01-12		1984-2012	
	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
異性間性行為	303	17.4%	319	19.4%	293	16.3%	342	17.4%	304	13.7%	4,929	20.3%
男男間性行為	1,031	59.3%	1,110	67.6%	1,366	76.1%	1,490	75.7%	1,718	77.2%	12,221	50.4%
同性間性行為	884	50.8%	954	58.1%	1,168	65.0%	1,300	66.1%	1,485	66.8%	10,151	41.9%
雙性間性行為	147	8.4%	156	9.5%	198	11.0%	190	9.7%	233	10.5%	2,070	8.5%
血友病患	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	53	0.2%
注射藥癮者	393	22.6%	184	11.2%	116	6.5%	109	5.5%	81	3.6%	6,686	27.6%
接受輸血者	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	2	0.1%	0	0.0%	23	0.1%
母子垂直感染	3	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%	30	0.1%
不詳	9	0.5%	29	1.8%	20	1.1%	25	1.3%	120	5.4%	297	1.2%
總計	1,740	100.0%	1,643	100.0%	1,796	100.0%	1,968	100.0%	2,224	100.0%	24,239	100.0%




通報感染人數依年齡別統計 (73-101年)





本國籍15-24歲感染者歷年危險因子分布 (1984-2012)







衛生署疾病管制局

本國籍HIV感染者 診斷年齡層個案數(1984-2012)


臺北區 (N=9418)




基隆市 (n=491)




台北市 (n=3346)




宜蘭縣 (n=271)



新北市 (n=5298)



金門縣 (n=12)





網路約炮風險高 愛滋上身自理難
雞尾酒療富貴病 可供一家堪溫飽

預防愛滋 做好準備

- 延遲第一次性行為的發生
- 避免不安全性行為/全程使用保險套
- 事件通報及處置（指定醫院）

同志健康諮詢熱線 0800 010 569

疫情通報及關懷專線 1922

疾病管制局全球資訊網 www.cdc.gov.tw





*Spearman's Correlation Coefficients Between Substance Use and AIDS-Risking Sexual Contacts Score**

Substance	r
Alcohol	.16*
Tobacco	.07
Marijuana	.10†
Stimulants	.31***
Depressants	.29***
Cocaine	.17**
Heroin	.09
PCP	.23***
Hallucinogens	.32***
Inhalants	.22**
IV drug use (shared works)	.23**

*Sex with someone who may have: had VD, been exposed to someone with AIDS, had AIDS or AIDS virus, been a prostitute, been a hemophiliac, been bisexual or homosexual, been an IV drug user.

* $p < .05$; ** $p < .01$; *** $p < .001$; † $p = .06$.

依據成癮物質的國際研究發現，許多藥物的濫用會增加性行為間得到愛滋病的風險，有關的藥物濫用包括：刺激性藥物(如安非他命, 搖頭丸)、鎮靜性藥物(如FM2, 一粒眠)、幻覺劑與靜脈注射毒品等。



網路約炮風險高

台北轄區552例新增個案調查（101/9/1至102/3/31）

- 認識朋友的地點

- 65.5% 網路
- 10.8% 朋友家、餐廳
- 9.5% 三溫暖(或浴場)
- 6.1% PUB

- 發生「無套性行為地點」

- 73.4% 自宅
- 10.9% 旅館
- 8.3% 三溫暖(或浴場)
- 3.5% 休閒場所



大專院校如何配合及加強宣導

- 機會宣導：新生入學、軍訓課程、導師會議、社團幹部研習、社團活動（春暉社、同志社團、話劇社...）、班會時間、愛滋宣導月
- 善用通路：FB、校園網路、電子看板、電視、佈告欄、與其他活動共同包裝（例如：系學會的活動）
- 創造話題
 - ✓ 校園是否可以裝設保險套販賣機？
 - ✓ 使用保險套時可否使用油性潤滑劑？
 - ✓ 家有愛滋病感染者你會如何處理？
- 尋找支援
 - 政府單位
 - 民間團體

不慎發生危險性行為之後續處置
進行暴露後預防

1. 72小時內至愛滋病指定醫院
2. 經過臨床醫師評估
3. 預防性投藥



在台北區可以去哪裡找宣導支援？

- 中央單位：衛生署疾病管制局第一分局
吳俊賢科長 3393-5033、陳紫君執行長 3393-5082
- 地方單位：
 - － 台北市政府衛生局 洪靜琪股長 2375-9800*1970 洪啟章 分機 1980
 - － 新北市政府衛生局 曾毓珊股長 2257-7155*1155 謝孟恆 分機 1173
 - － 基隆市衛生局 蔡逸寧 2423-0181*146
 - － 宜蘭縣衛生局 蔡美英 03-9356519
- 民間團體
 - － 台灣紅絲帶基金會（愛現幫） 2559-2059
 - － 台灣誼光協會 2375-5413
 - － 大台北同學會（同志健康中心）